

Họ và tên: .....Lớp: 12 Số báo danh: .....

Mã đề 358

**Câu 1.** Vai trò của enzym ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là

- A. lắp ráp các nucleôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.
- B. tháo xoắn phân tử ADN.
- C. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN.
- D. nối các đoạn Okazaki với nhau.

**Câu 2.** Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nucleôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen?

- A. Thay cặp nucleôtit G-X bằng cặp A-T.
- B. Thêm một cặp nucleôtit.
- C. Thay cặp nucleôtit A-T bằng cặp T-A.
- D. Mất một cặp nucleôtit.

**Câu 3.** Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX?

- A. Hổ, báo, mèo rừng.
- B. Thỏ, ruồi giấm, sư tử.
- C. Châu chấu, rệp, bọ xít.
- D. Gà, bò câu, bướm.

**Câu 4.** Cho biết các cô đơn mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; XXX – Pro; GXU – Ala; XGA – Arg; UXG – Ser; AGX – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nucleôtit là 5'AGXXGAXXXGGG3'. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn polipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là

- A. Ser-Ala-Gly-Pro
- B. Ser-Arg-Pro-Gly
- C. Gly-Pro-Ser-Arg.
- D. Pro-Gly-Ser-Ala.

**Câu 5.** Đột biến gen là

- A. sự biến đổi tạo nên những kiểu hình mới.
- B. sự biến đổi tạo ra những alen mới.
- C. sự biến đổi một hay một số cặp nucleotit trong gen.
- D. sự biến đổi một cặp nucleotit trong gen.

**Câu 6.** Ở người, một số bệnh di truyền do đột biến lệch bội được phát hiện là

- A. claiphentơ, máu khó đông, Đào.
- B. claiphentơ, Đào, Tơcnơ.
- C. siêu nữ, Tơcnơ, ung thư máu.
- D. ung thư máu, Tơcnơ, Claiphentơ.

**Câu 7.** Bản chất của mã di truyền là

- A. các axit amin được mã hoá trong gen.
- B. trình tự sắp xếp các nucleôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.
- C. một bộ ba mã hoá cho một axit amin
- D. ba nucleôtit liên kế cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axit amin.

**Câu 8.** Một phân tử ADN có chiều dài 5100A°, có số nu loại T = 600. Số liên kết hiđro là

- A. 4000 .
- B. 4990
- C. 3800
- D. 3900

**Câu 9.** Trình tự phù hợp với trình tự các nu được phiên mã từ 1 gen có đoạn mạch bổ sung là 5' AGXTTAGXA 3' là

- A. 5'UXGAAUXGU3'
- B. 5'AGXUUAGXA3'.
- C. 3'AGXUUAGXA5'.
- D. 3'UXGAAUXGU5'.

**Câu 10.** Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là

- A. vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc.
- B. vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng kết thúc.
- C. vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng mã hoá.
- D. vùng vận hành, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

**Câu 11.** Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nucleôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc

- A. bổ sung. B. bổ sung và bảo toàn.  
C. bổ sung và bán bảo toàn. D. bán bảo toàn.

**Câu 12.** Cho phép lai **Bố: AaBBCc x mẹ: AaBbcc**, số kiểu gen, kiểu hình phép lai đó là

- A. 12KG, 4KH B. 16KG, 4KH. C. 18KG, 4KH D. 16KG, 8KH

**Câu 13.** Ở người bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST X quy định. Một người nam bình thường lấy một người nữ bình thường có kiểu gen dị hợp, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là?

- A. 100% nam không bị bệnh  
B. 100% nam bị bệnh, 50% nữ bị bệnh, 50% nữ không bị bệnh  
C. 100% nam, nữ bị bệnh  
D. 100% nữ không bị bệnh, 50% nam bị bệnh, 50% nam không bị bệnh

**Câu 14.** Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra ở đời con có 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình?

- A. AaBbDd × AaBbDD. B. AaBbdd × AabbDd  
C. AaBbDd × aabbDD. D. AaBbDd × aabbdd

**Câu 15.** Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nucleôtit là: **A = T = 600** và **G = X = 300**. Tổng số liên kết hiđrô của gen này là

- A. 1800. B. 1500. C. 3900. D. 2100.

**Câu 16.** Một gen có 480 adenin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nucleôtit là

- A. 1800 B. 2400 C. 3000 D. 2040

**Câu 17.** Trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai AaBB x Aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ

- A. 1 : 1. B. 1 : 1 : 1 : 1. C. 9 : 3 : 3 : 1. D. 1 : 2 : 1.

**Câu 18.** Khi nói về tần số hoán vị gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.  
B. Các gen nằm càng gần nhau trên một nhiễm sắc thể thì tần số hoán vị gen càng cao.  
C. Tần số hoán vị gen lớn hơn 50%.  
D. Tần số hoán vị gen luôn bằng 50%.

**Câu 19.** Vùng kết thúc của gen là vùng

- A. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã  
B. quy định trình tự sắp xếp các aa trong phân tử prôtêin  
C. mang tín hiệu kết thúc phiên mã  
D. mang thông tin mã hoá các aa

**Câu 20.** Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nucleôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?

- A. 9 loại mã bộ ba. B. 27 loại mã bộ ba. C. 6 loại mã bộ ba. D. 3 loại mã bộ ba.

**Câu 21.** Ở người, bệnh mù màu (đỏ- lục) do gen lặn nằm trên NST giới tính X gây nên (Xm), không có alen trên NST Y. Một cặp vợ chồng phân biệt màu rất rõ nhưng lại sinh một đứa con trai bị mù màu. Gen gây bệnh mù màu của bé trai nói trên có nguồn từ

- A. bố người chồng. B. mẹ C. bố D. mẹ của người vợ.

**Câu 22.** Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là

- A. UUG, UGA, UAG B. UAG, UAA, UGA  
C. UGU, UAA, UAG D. UUG, UAA, UGA

**Câu 23.** Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài, v quy định cánh cụt. Cho ruồi cánh dài và cánh cụt giao phối với nhau thu được F<sub>1</sub> có tỉ lệ 50% ruồi cánh dài : 50% ruồi cánh cụt. Tiếp tục cho ruồi F<sub>1</sub> giao phối với nhau thì ở F<sub>2</sub> thống kê kết quả ở quần thể có kiểu hình như thế nào?

- A. 1 ruồi cánh cụt : 3 ruồi cánh dài. B. 9 ruồi cánh cụt : 7 ruồi cánh dài  
C. 1 ruồi cánh cụt : 1 ruồi cánh dài. D. 5 ruồi cánh cụt : 7 ruồi cánh dài.

**Câu 24.** Một NST có trình tự các gen là: ABCDEFGH.I bị đột biến thành NST có kiểu gen là: CDEFG.HI đây là dạng đột biến nào:

- A. Mất đoạn                      B. Chuyển đoạn                      C. Đảo đoạn                      D. Lặp đoạn

**Câu 25.** Kiểu tác động qua lại hai hay nhiều gen thuộc những locut khác nhau làm xuất hiện một tính trạng mới gọi là

- A. cả ba trường hợp trên                      B. tác động cộng gộp  
C. tác động bổ trợ                      D. tác động át chế

**Câu 26.** Khi Cá thể mang gen **BbDbEEff** giảm phân bình thường sinh ra các kiểu giao tử là

- A. BbEE, Ddff, BbDd, Eeff                      B. BbDd, Eeff, Bbff, DdEE  
C. B, b, D, d, E, e, F, f                      D. BDEf, bdEf, BdEf, bDEf

**Câu 27.** Yếu tố được di truyền nguyên vẹn từ bố hoặc mẹ sang con

- A. tính trạng.                      B. kiểu gen.                      C. kiểu hình.                      D. alen.

**Câu 28.** Cơ thể có KG  $\frac{Ab}{aB}$  khi phát sinh giao tử cho tỉ lệ các loại giao tử bao nhiêu, biết **f** = 16%

- A. Ab=aB= 34%, AB=ab= 16%.                      B. Ab=aB= 42%, AB=ab= 8%.  
C. Ab=aB=8%, AB=ab= 42%.                      D. Ab=aB=16%, AB=ab= 34%..

**Câu 29.** Phương pháp lai và phân tích con lai của Mendel bao gồm các bước sau:

1. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.
2. Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi một hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở đời F1, F2, F3.
3. Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.
4. Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết của mình.

Hãy sắp xếp các bước sau theo trình tự hợp lí:

- A. 3, 2, 4, 1.                      B. 3, 4, 1, 2.                      C. 3, 2, 1, 4.                      D. 2, 3, 4, 1

**Câu 30.** Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là

- A. Aa x aa.                      B. Aa x Aa.                      C. AA x Aa.                      D. AA x aa.

----- **HẾT** -----